

ANGREŠT a RYBÍZ

-

ABIOTICKÉ PORUCHY CHOROBY A ŠKŮDCI




DEFICIENCE DRASLÍKU



Ochrana: draselná hnojiva (např. draselná sůl, Kamex, Korn Kali, síran draselný, Patentkali, CK-sol, SK-sol apod.)

SPRCHÁVÁNÍ

Příčina: nedostatečné opylení, sucho a horko



VIROVÝ ZVRAT ČERNÉHO RYBÍZU

Příčina: virus Blackcurrant reversion associated virus - BRAV



zdravý list

příznaky na listech

Ochrana: likvidace vlnovníka rybízového, likvidace napadených rostlin, odolnější odrůdy (např. 'Ben Gairn')



příznaky na květech

HNĚDÉ PADLÍ ANGREŠTU - I

Příčina: houba *Podosphaera mors-uvae*



počáteční ...



... a silné napadení plodů



HNĚDÉ PADLÍ ANGREŠTU - II

příznaky v zimě ...



... v červenci ...



napadení letorostů
a listů angreštu

... v červnu ...



... a v září



HNĚDÉ PADLÍ ANGREŠTU - III



plody ...



... listy ...



... a výhon rybízu




Ochrana: odolnější odrůdy (např. angreš – Alan, Dagmar, Dukát, Invicta, Kaptivátor, Karát, Karmen, Martlet, Pax, Prima, Remarka, Resistentá, Rixanta, Rokula, Rolonda, Zebín, velmi náchylný Favorit; rybíz Ben Gairn, Ben Hope, Ben Lomond, Tisel, Titania, Triton), **vzdušné porosty a rostliny, odstraňování napadených částí, postřiky přípravky Discus**, (jen angreš), **Kumulus WG**, Síra BL, Sulfolac 80 WG, Sulfurus, Topas 100 EC (=Americké padlí Stop), VitiSan, Zato 50 WG

ANTRAKNÓZA RYBÍZU

Příčina: houba *Drepanopeziza ribis* (anam. *Gleosporidiella ribis*)



angrešt



rybíz



Ochrana: odolnější odrůdy (např. 'Blanka', 'Heinemannův pozdní', 'Holandský červený', 'Hron', 'Rondom', 'Tatran'), vzdušné porosty a rostliny, odstraňování napadených listů, postřiky přípravky Cuprozin Progress, Dithane DG Neotec, Novozir MN 80 New – především po odkvětu

ŠEDÁ HNILOBA

Příčina: houba *Botrytis cinerea*



... od květu

poškození plodů ...



... od poškození
trnem

v místě naroubování



odumírání větví



báze kmínku

rybíz



SLOUPEČKOVÁ RZIVOST RYBÍZU

Příčina: houba *Cronartium ribicola*



vrchní ...



'Josta'



... a spodní strana napadeného listu rybízu



příznaky
na
vejmutovce



angrešt



silně poškozený porost rybízu

Ochrana: nepěstovat rybíz v blízkosti vejmutovky, odstraňovat napadené části vejmutovek, pěstovat odolnější odrůdy (např. Démon, Kozolupský raný, Vebus, náchylná je Moravia a Öjebyn), ošetření přípravky Dithane DG Neotec, Zato 50 WG

VLNOVNÍK RYBÍZOVÝ

Příčina: roztoč *Cecidophyopsis ribis*



Ochrana: pěstovat odolnější odrůdy (např. Ben Hope, Ben Lomond), v předjaří odstraňovat větve s poškozenými pupeny. Při napadení více než 15 % pupenů je vhodné odstranit celé keře

MŠICE SRSTKOVÁ

Příčina: mšice *Aphis grossulariae*



angrešť



rybíz



meruzalka



deformace letorostů

Ochrana: přípravky Calypso 480 SC, Movento 100 SC, Neudosan, Neudosan AF, Pirimor 50 WG, Spruzit nebo Zdravá zahrada přípravek proti škůdcům

MŠICE RYBÍZOVÁ

Příčina: mšice *Cryptomyzus ribis*

rybíz červený ...



vrchní ...



... a spodní strana listu




... a bílý




Ochrana: přípravky Calypso 480 SC, Neudosan, Neudosan AF, Pirimor 50 WG, Spruzit nebo Zdravá zahrada přípravek proti škůdcům

PUKLICE ŠVESTKOVÁ

Příčina: červec *Parthenolecanium corni*



zimolez kamčatský




angrešť



Ochrana: lepy a leповé pásy (nejpozději začátkem března)

NESYTKA RYBÍZOVÁ

Příčina: motýl *Synanthedon vespiformis*



Ochrana: včasné odstraňování napadených vadnoucích větví